

Απορροφήσιμη αιμοστατική σκόνη Οξειδωμένης Αναγεννώμενης Κυτταρίνης με ψεκαστικό μηχανισμό. Να επιφέρει αιμόσταση σε λιγότερο των 35 δευτερολέπτων, με αποδεδειγμένη διεισδυτική ικανότητα στο αίμα φθάνοντας την κύτη της αιμορραγικής περιοχής, βάσει μελέτης. Πλήρως απορροφήσιμη από 7 έως 14 ημέρες. Να έχει βακτηριοκτόνο δράση για το μέγιστο εύρος μικροοργανισμών ΛΠΧ συμπεριλαμβανομένων των *Staphylococcus aureus*, *Bacillus subtilis*, *Staphylococcus epidermidis*, *Proteus vulgaris*, *Micrococcus luteus*, *Corynebacterium xerosis*, *Streptococcus pyogenes* Group A, PRSP. Με εύκαμπτο εφαρμογέα για δύσκολα προσβάσιμες περιοχές, περιεχόμενο/ συσκευή=3gr.

1η ΥΠΕ - ΓΝΑ ΕΛΕΝΑ ΞΕΝΕΛΑΟΥ - ΑΘΕΝΑ
Γ.Ν.Α. - Α.Δ.Ρ.Α.
Α' ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΔΙΔΗΤΡΙΟ
ΑΝΚΑ 2512000013 - Α.Μ. 1247