

Απορροφήσιμη αιμοστατική σκόνη Οξειδωμένης Αναγεννώμενης Κυτταρίνης με ψεκαστικό μηχανισμό. Να επιφέρει αιμόσταση σε λιγότερο των 35 δευτερόλεπτων, με αποδεδειγμένη δεισδυτική ικανότητα στο αίμα φθάνοντας την κύτη της αιμορραγικής περιοχής, βάσει μελέτης. Πλήρως απορροφήσιμη από 7 έως 14 ημέρες. Να έχει βακτηριοκτόνο δράση για το μέγιστο εύρος μικροοργανισμών ΛΧΠ συμπεριλαμβανομένων των : Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Staphylococcus epidermidis, Proteus vulgaris, Micrococcus luteus, Corynebacterium xerosis, Streptococcus pyogenes Group A, PRSP. Με εύκαμπτο εφαρμογέα για δύσκολα προσβάσιμες περιοχές, περιεχόμενο/συσκευή= 3gr.

1η Υ.ΠΕ. - Γ.Ν.Α. ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ  
Γ.Ν.Α. "ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ"  
Α' ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΠΑ  
**ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΩΜΑΣ**  
ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ  
ΑΜΚΑ: 29076300218 - Α.Μ. ΤΣΑΥΣ 77190