

Απορροφήσιμος βιοενεργός αιμοστατικός παράγοντας σε μορφή γέλης με τουλάχιστον 2.500 θρομβίνης και ατελοκολλαγόνο( υψηλής περιεκτικότητας κολλαγόνο). Το μείγμα της θρομβίνης και του ατελοκολλαγόνου να είναι ομογενοποιημένο και ο φορέας να είναι προφορτωμένος σε σύριγγα ώστε η ανάμειξη να γίνεται σε λιγότερο από τριάντα δευτερόλεπτα.

Ιν ΥΠΕ - ΓΝΑ "ΣΑΒΒΑ ΡΕΝΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ"  
Γ. Α. ΣΑΒΒΑ ΡΕΝΙΟΥ Α. Ε. Α. Ε. Α.  
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ  
Κ.Θ. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ  
ΑΜΚΑ: 0509640100, Τ.Σ.ΑΥ: 63914