

Απορροφήσιμος βιοενεργός αιμοστατικός παράγοντας σε μορφή γέλης με τουλάχιστον 2.500 θρομβίνης και ατελοκολλαγόνο( υψηλής περιεκτικότητας κολλαγόνο). Το μείγμα της θρομβίνης και του ατελκολλαγόνου να είναι ομογενοποιημένο και ο φορέας να είναι προφορτωμένος σε σύριγγα ώστε η ανάμειξη να γίνεται σε λιγότερο από τριάντα δευτερόλεπτα.

Τ<sup>η</sup> ΥΠΕ - Γ.Ν.Α. ΕΛΛΑΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ  
Α' ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - Γ.Ν.Α. ΕΛΛΑΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ  
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ  
ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ  
ΑΔΑΚΑ: 02447903390 - Α.Μ. ΤΣΑΥ: 113786